



濾過除菌-Seitzの濾過器

バクテリアを濾過する。

現在では、メンブランフィルターを用いる。



タバコモザイクウイルスに感染した葉 I



タバコモザイクウイルスに感染した葉 II



抵抗性遺伝子（6遺伝子）を持つタバコ葉にTMV(タバコモザイクウイルス)を感染させると、感染細胞が個体的に死ぬためウイルスの増殖は感染部位に止まり、葉全体には広がらない。この反応は過敏反応(HR, hypersensitive reaction)と呼ばれる。

ウイルス発見

タバコの葉にモザイク模様の病斑を起こす病気がタバコの絞り汁で伝染することが知られていた。▶ 細菌感染と考えられていた。

Iwanowsky (1892) : 絞り汁を当時使われていた細菌をのぞくために使われていた素焼きの濾過器を通して感染性が残っていた。
▶ 細菌の産生した毒素の様なもの又は非常に小さい細菌と想像

Beijerinck (1898) : Iwanowskyの追試を行い、細菌の可能性を否定した。▶ 濾過器を通り抜ける自己増殖能を持つ物体と主張、virus(ウイルス:ラテン語の毒の意味)と名を付けた。


Stanley (1935) : 感染性を示すTMVの結晶化に成功。▶ 自己触媒能を持つ巨大蛋白質であったと報告。▶ 超微小生物であるウイルスが結晶化される化学物質であるという大きな発見。

TMVが蛋白質であるという知見

- 1) 蛋白質変性剤で感染性がなくなった。
- 2) 蛋白質分解酵素で感染性がなくなった。
- 3) TMVに対する抗血清が得られた。

Bawden & Pirie (1936) : TMVにリン酸と糖が含まれ、それがリボ核酸(RNA)であることを報告 ▶ しかし、RNAが感染性の本体であると気がついた人はだれもいなかった。

TMV粒子の電子顕微鏡写真



(1994年)

Electron micrograph of bacteriophage T4


1915年:
ツオート(F. W. Twort)がある種の細菌(ミクロコッカス, Micrococcus)のコロニーを溶かして透明にする感染性の物質があることを発見。

1917年:
デレル(F. d' Herelle)が、赤痢患者の便から、赤痢菌を特異的に殺し、しかも、赤痢菌のある時に限って自己増殖を行う目に見えない微生物を報告。


この微生物がバクテリアをむさぼり食うという意味からバクテリオファージと命名した。




T4ファージのプラーク




φX174のプラーク



T4ファージの菌体表面への吸着





ファージ吸着の様子




感染ファージの放出

ファージDNAの頭部からの放出




感染ファージとDNAの放出

バクテリオファージの形態形成アニメーション



T4ファージの形成過程



細菌の最近に発見されたバクテリオファージ微部構造に似た分泌装置

