


タバコモザイクウイルスに感染した葉！



ウイルス発見

タバコの葉にモザイク模様の病斑を起こす病気がタバコの絞り汁で伝染することが知られていた。→細菌感染と考えられていた。

Iwanowsky (1892) : 絞り汁を当時使われていた細菌をのぞくために使われていた素焼きの濾過器を通してても感染性が残っていた。
→細菌の産生した毒素の様なもの又は非常に小さい細菌と想像


Beijerinck (1898) : Iwanowskyの追試を行い、細菌の可能性と否定した。→濾過器を通り抜ける自己増殖能を持つ物体と主張、virus(ウイルス:ラテン語の毒の意味)と名を付けた。

Stanley (1935) : 感染性を示すTMVの結晶化に成功。→自己触媒能を持つ巨大蛋白質であったと報告。→超微小生物であるウイルスが結晶化される化学物質であるという大きな発見。


TMV粒子の
電子顕微鏡写真




TMVの構造





TMVの内部構造モデル
(Klug & Casper, 1960)



Aggregation state of TMV coat protein




Growth of TMV coat protein rods



Assembly of TMV

Structure of the TMV protein disk



155個のアミノ酸からなるモノマーが重合

Electron micrograph of bacteriophage T4


1915年:
ツオート (F. W. Twort) がある種の細菌 (ミクロコッカス, *Micrococcus*) のコロニーを溶かして透明にする感染性の物質があることを発見.

1917年:
デルレル (F. d' Herelle) が, 赤痢患者の便から, 赤痢菌を特異的に殺し, しかも, 赤痢菌のある時に限って自己増殖を行う目に見えない微生物を報告.


この微生物がバクテリアをむさぼり食うという意味からバクテリオファージと命名した.




T4ファージのプラーク




φX174のプラーク




T4ファージの菌体表面への吸着




ファージ吸着の様子



感染ファージの放出



ファージDNAの頭部からの放出



感染ファージとDNAの放出



T4 bacteriophage infecting an *Escherichia coli* cell





Bacteriophage T4 baseplate conformational change on attachment to a host cell

7 (red) · gp8 (blue) · gp9 (green) · gp10 (yellow) · gp11 (cyan) ·
The long tail fibers (gp34, gp35, gp36, gp37) and the short tail fibers (gp12) are shown in magenta.





バクテリオファージの形態形成アニメーション




T4ファージの構造とその遺伝子 (Eiserling, 1983)


Diagrammatic representation of bacteriophage T4



Injection of bacteriophage T4 DNA into an *E. coli* cell






T7バクテリオファージのミニセルへの感染を
クライオトモグラフィーで観察する



Science, v. 339, p.576- (2013)

T7バクテリオファージ感染のアニメーション



T4ファージの形成過程

